

雨后出现这种大蜗牛, 千万别碰!

近日,有媒体报道,广东、广西、福建等地的一些街道路面上出现了大蜗牛。根据网友晒出的图片,大蜗牛几乎和一个成年人的脚掌一般大。还有不少人出于好奇,徒手将其抓了起来。网友纷纷提醒:千万别碰!这是非洲大蜗牛,有毒。

非洲大蜗牛的危害

我国首批16种外来入侵物种之一


喜欢吃农作物、林木、蔬菜和花卉等植物

可危害500多种作物

它是许多人畜寄生虫和病原菌的中间宿主

会传播结核病和嗜酸性脑膜炎

制图 王思祺



非洲大蜗牛有哪些危害?

非洲大蜗牛,又名褐云玛瑙螺,是我国首批16种外来入侵物种之一。它们喜欢吃农作物、林木、蔬菜和花卉等植物,可危害500多种作物,是国家进出境二类检疫性有害生物。

非洲大蜗牛因为不能在水中存活,一旦下大雨,便会从躲藏处爬出来。它们喜欢出现在雨后,这是因为它们平常只敢在草丛中潮湿处活动,爬到路上可能会干死、晒死。下雨后路面潮湿,它们才敢爬出来。

这种大蜗牛的外壳较厚,有光泽,成体壳长一般为5厘米至10厘米,最大可超过20厘米,外壳通常呈红棕色,有淡黄色的垂直斑点,但颜色因环境条件和饮食而异,浅咖啡色较为常见。

2022年,农业农村部等六部门将非洲大蜗牛列入《重点管理外来入侵物种名录》。目前主要分布于我国福建、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南以及港澳台等地区。

大蜗牛是许多人畜寄生虫和病原菌的中间宿主,会传播结核病和嗜酸性脑膜炎。其身上携带多种细菌,用手触摸,会引起皮炎、皮肤瘙痒、肿胀等。其身上寄生着各种寄生虫,最常见的是广州管圆线虫,这种寄生虫会往人体的中枢神经或脑脊液里“钻”,一旦感染,患者会不断发热、头痛,引发脑膜炎,严重的还会危及生命。

2

接触非洲大蜗牛后如何避免被感染?

据了解,非洲大蜗牛一次可以产下30粒到700粒卵,繁殖速度很快,它爬行的地方会留下黏液,黏液本身就携带着病原体,甚至在它们的粪便中,依旧存活着病菌和寄生虫。如不小心接触到非洲大蜗牛,要及时做好清洗工作。

如果同学们在居住的小区发现数量较多的非洲大蜗牛,千万别碰它们,可以找物业公司进行处理,或者找专业的杀虫公司处理。如果在家里发现少数非洲大蜗牛,可利用食盐处理,蜗牛被撒食盐后,软体部分会融化成水而死亡。

避免被非洲大蜗牛感染,需要做到三“要”三“不要”:

三“要”

1.洗手升级版:手部接触非洲大蜗牛后,用75%酒精消毒+肥皂搓洗20秒。

2.蔬菜消毒法:被大蜗牛爬过的蔬菜用流动水冲洗30秒后,再用果蔬消毒剂浸泡10分钟,尤其叶菜背面要重点处理。

3.环境防护法:在非洲大蜗牛经常出现的撒咖啡渣、石灰粉(蜗牛克星),每周清理排水沟积叶。

三“不要”

1.提醒小朋友们不要捡拾非洲大蜗牛当玩具。

此前,广东一名10岁男孩在路边抓“大蜗牛”玩后出现持续、反复的发热和头痛症状,最终被确诊患上广州管圆线虫嗜酸性脑膜炎。

2.不要相信“高温烹煮非洲大蜗牛可食用”的说法,非洲大蜗牛即使煮熟了,也不能保证食用的安全性。

3.如在小区发现数量较多的非洲大蜗牛,不要自行喷洒农药(可能污染水源),可以找物业公司进行处理,或者找专业的杀虫公司处理。

华西都市报-封面新闻记者 戴竺芯
综合央视新闻微信公众号、深圳疾控中心、南方都市报、生态总站微信公众号等



广西柳州市民黄女士在弯塘路看到的大蜗牛,足有她半个手掌大。
图据玉林晚报