



感染新冠后咳嗽发生率超过77%

“四川省新冠感染情况问卷调查(第二次)”结果出炉

12月24日,为了再次快速评估全省新冠病毒感染情况,四川省疾控中心通过网络发布第二轮调查问卷。在大家的积极支持和转发下,截至25日12时,全省共有158506人参加了调查,涉及21个市州183个县(区、市)。调查结果分析如下。



天的比例略高。

截至调查结束时间,48%的新冠病毒感染者尚未痊愈,38.62%的患者病程超过5天。

从年龄分布来看,25岁以下人群病程在3天以内比例略多,其他年龄段病程比例分布较接近,与持续咳嗽时间结果相似,65岁及以上老年人病程大于10天的比例更高。

有多少人已经感染了?

被调查者158506人,新冠病毒核酸或抗原阳性100679人,感染率为63.52%,较12月19日首轮调查结果(46.93%)上升16.59个百分点。

哪里感染的人比较多?

除攀枝花市、宜宾市外,其他19个地区感染率均超过50%,感染率排前5位的为德阳市、成都市、绵阳市、达州

市和资阳市。

其中,城市地区感染率为65.42%,农村地区感染率为54.91%。183个县(区、市)中,有24个感染率大于等于70%;164个感染率大于等于50%。

何时发现自己“阳”了?

根据居民自填的核酸或抗原检测阳性时间分布来看,全省阳性检出的高峰期集中在12月12日~23日,目前日新增感染已处于回落阶段。从居民症状出现时间分布来看,症状首次发生从12月10日开始上升,24日已降至8~9日水平,新发症状回落

更早,其时间趋势较病毒检出时间要早2日左右。

“阳”后经历了什么?

调查158506人中,临床症状以咳嗽、发烧、乏力和浑身酸痛、流涕鼻塞为主。

其中,122464人有发生不同程度的咳嗽,咳嗽发生率为77.26%。根据基础疾病患病情况分析,患有慢阻肺、其他呼吸道疾病的人咳嗽超过10天的比例更高。

从年龄分布来看,12岁以下儿童咳嗽多在5天以内,大部分在3~10天,65岁以上老年人咳嗽超过10

特别说明

1.由于采取的在线问卷调查方式,本调查人群多覆盖平时使用手机较多,关注四川疾控公众号、关心健康的城市人群,其他未填写问卷者的情况可能与填写者有所不同,因此,调查结果与实际情况可能存在一定差异,仅供参考。

2.本次调查的阳性率在63.52%左右,另外还有28%的调查人群虽未测核酸或抗原,但有发烧、咳嗽等类新冠病毒感染症状,因此本次调查人群的新

冠病毒实际感染率应高于63.52%。

老人感染新冠,家里要配备制氧机吗?

在购买防疫物资的过程中,许多人有这样的疑问,家用有必要配备制氧机吗?有基础病的老人感染新冠病毒后,是否可以在家吸氧呢?一起来听听医生的解答。

通常情况下,在呼吸科有两种疾病,医生可能会建议家属给患者买制氧机——严重的慢性阻塞性肺病和严

重的间质性肺病。医生提醒,在不缺氧的情况下,吸氧其实没有太大的帮助。如果病人确实缺氧,有明显的呼吸困难、氧饱和度低,如果情况允许,应到医院就诊,而不是自己在家吸氧缓解。

对于家里本就有制氧机的患者,在感染新冠后,也不是必须把氧气调

到最大。对于有间质性肺病的患者来说,氧气流量调大一般没有问题,但是慢性阻塞性肺病的患者平时一般只需低流量吸氧,他们在感染新冠病毒后,氧流量不要立即调得太大,因为缺氧完全纠正后,可能会引起二氧化碳升高,导致病人出现意识淡漠、精神萎靡等表现,也称为二氧化

碳脑病,所以不要随便调整患者的氧流量。

除此之外,可以根据情况在家里备一个指夹式血氧仪,有基础病的患者感染新冠后,可以监测血氧饱和度,如果相比正常时出现明显下降,需要及时到医院就诊。

据“央视财经”



中国西部第一份社区报

华西社区报

(CN51-0131)

温度。互动。实用。

免费直投到家



四川日报报业集团主办