




今年10月29日是第21个世界卒中日。卒中,也就是大家常说的中风,属于急性脑血管病,分为缺血性、出血性两大类,是我国成年人致死、致残的首要疾病,有着高发病、高死亡、高致残、高复发的特点。不少人觉得中风是老年病,可随着熬夜、重油重盐饮食、长期久坐等习惯增多,中青年发病的情况越来越多见。五冶医院神经内科主任医师胡霞提醒:卒中救治,时间就是大脑。请大家提高警惕、及早识别卒中信号,抢抓黄金救治时间;主动管控危险因素,远离卒中危害。

□ 华西社区报记者 杨铠



卒中防治 即刻行动

记牢识别口诀,抢好大脑救治黄金时间

卒中凶险,在于它常常毫无预兆、突然发作。简单来说,就是脑血管堵了或者破裂,脑组织随之缺血缺氧、发生坏死。脑细胞对缺血十分敏感,救治的核心就是抢时间。有数据显示,卒中发作后,每耽误一分钟,就有约190万个脑细胞发生不可逆坏死,越早送到具备救治能力的卒中中心,留下偏瘫、失语等后遗症的概率越低。社区是卒中防控的前沿阵地,学会识别预警信号,就是守护自己和邻里的第一道防线。

国内大家熟悉的是“中风120”口诀,操作简单,适合居家自测:笑一笑,看面部是否对称、口角歪斜;举一举,双臂平举,检查有没有一侧无力下垂;说一句,观察说话是否含糊、词不达意,或是听不懂旁人话语。只要任意一项出现异常,就要高度警惕。

除此之外,国际通用的BE FAST口诀覆盖了更多容易被忽略的信号,居民也可以一并了解。B(Balance 平衡):突然走路不稳、身体失

衡,甚至摔倒;E(Eyes 眼睛):突然视物模糊、看东西重影,或是一侧视野看不见;F(Face 面部):面部不对称、口角歪斜;A(Arm 手臂):单侧手脚突然麻木无力;S(Speech 言语):说话不清、表达混乱;T(Time 时间):一旦发现上述任一突发症状,立刻记下发病时间,马上拨打120。

这里要划一个重点:关键词是突然出现。很多居民遇到过这种情况:头晕、手脚发麻,几分钟之后症状自行消失,就觉得没事了。医生提醒,这是短暂性脑缺血发作,俗称“小中风”,是大脑发出的强烈警报,短期内发生严重卒中的风险很高,哪怕症状很快消失,也一定要尽快到医院检查评估,不能抱有侥幸心理。

一旦怀疑卒中,千万不要等、不要自行吃药,也不要搀扶病人自行前往医院,拨打120后,准确报清地址和发病时间即可。成都已经建成全市卒中中心网络,搭建起一小时救治圈,急救人员会优先把患者转运到能开展溶栓、取栓的

医院,开通绿色通道优先救治。

卒中可防可控,管好危险因素才是根本。高血压是卒中最主要的危险因素,糖尿病、血脂异常、房颤,加上吸烟酗酒、超重肥胖、长期久坐、睡眠呼吸暂停,都会推高发病风险。眼下气温起伏大,血管容易收缩波动,高血压人群不要随意停药、盲目“秋冻”,早晚做好头颈部保暖,定时监测血压。

社区慢病居民,可以依托社区卫生服务中心做好血压、血糖、血脂的长期随访;35岁以上人群首诊建议测血压,定期体检筛查房颤。日常饮食清淡少盐,坚持适度运动,戒烟限酒。已经得过卒中的患者,复发风险偏高,一定要遵医嘱长期服药,不要自己停药换药,规范开展康复训练,才能更好回归正常生活。

卒中防治,既要急症来临时果断出手,更要把预防融入日常。不妨把识别口诀教给家里老人和亲友,早识别、早送医,守住我们的脑健康。